


ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ


ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



# ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ (DMFT index) ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 12 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ



# ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 35-44 ΚΑΙ 65-74 ΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ



# ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

- ✦ *Ο δείκτης τερηδόνας στην Ελλάδα παρουσιάζει τάση μείωσης, εξακολουθεί όμως να είναι υψηλός σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,*
- ✦ *Το ποσοστό μερικής νωδότητας για τα άτομα της τρίτης ηλικίας είναι εξαιρετικά υψηλό,*
- ✦ *Όσο μειώνεται το μηνιαίο εισόδημα, τόσο αυξάνονται οι ανάγκες για Μερικές Οδοντοστοιχίες.*

# Μερική οδοντοστοιχία

- **μόνιμη μερική οδοντοστοιχία**
- **μεταβατική μερική οδοντοστοιχία**

# Μεταβατική Μερική Οδοντοστοιχία

- + Η Μ.Ο. που χρησιμεύει σαν μία προσωρινή προσθετική εργασία στην οποία προσθέτονται σταδιακά τεχνητά δόντια σε αντικατάσταση των φυσικών δοντιών που χάνονται
- + Δίνει στους στηρικτικούς ιστούς τον χρόνο να διαμορφωθούν τελειότερα

(Glossary of Prosthodontic Terms)



# Μερικές οδοντοστοιχίες

- συμβατικές μερικές οδοντοστοιχίες
- άμεσες μερικές οδοντοστοιχίες
- επένθετες μερικές οδοντοστοιχίες

# Μερικές οδοντοστοιχίες





# Άμεσες μερικές οδοντοστοιχίες



Εκμαγείο μελέτης



μετά τις εξαγωγές



στην ίδια συνεδρία τοποθέτηση  
της άμεσης ΜΟ άνω

# Επένθετες μερικές οδοντοστοιχίες



*τηλεσκοπική στεφάνη  
και επένθετη ΜΟ*

Στήριξη

Συγκράτηση


Σταθερότητα

Η **λειτουργική σταθερότητα** της Μερικής


Οδοντοστοιχίας εξασφαλίζεται με συγκρατητικά

στοιχεία με τα οποία εφαρμόζει στα δόντια


στηρίγματα.



**Συγκράτηση**



**Στήριξη**



**Σταθερότητα**


# ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

- Η πληθώρα των συνδυασμών νωδότητας για κάθε γνάθο (περίπου 65.000),
- το είδος κινητών προσθέσεων για την αποκατάστασή τους, και
- η ανάγκη μιας ορθολογιστικής επικοινωνίας μεταξύ οδοντιάτρων και οδοντοτεχνιτών,

οδήγησε σε διάφορα συστήματα ταξινόμησης με επικρατέστερο την κατά Kennedy (4 ομάδες)


# Ταξινόμηση κατά Kennedy

- ◆ **I. Αμφοτερόπλευρα νωδές περιοχές πίσω από τα φυσικά δόντια,**



# Ταξινόμηση κατά Kennedy (υποομάδες)

- ◆ I. Αμφοτερόπλευρα νωδές περιοχές πίσω από τα φυσικά δόντια,



# Ταξινόμηση κατά Kennedy


- ◆ **II. Ετερόπλευρα νωδή περιοχή πίσω από τα φυσικά δόντια,**






# Ταξινόμηση κατά Kennedy (υποομάδες)

- ◆ **II. Ετερόπλευρα νωδή περιοχή πίσω από τα φυσικά δόντια,**




# Ταξινόμηση κατά Kennedy

- ◆ **III. Ετερόπλευρα νωδή περιοχή με ύπαρξη τελευταίου γομφίου,**




# Ταξινόμηση κατά Kennedy (υποομάδες)

- ◆ III. Ετερόπλευρα νωδή περιοχή με ύπαρξη τελευταίου γομφίου,




# Ταξινόμηση κατά Kennedy

- ◆ IV. Πρόσθια νωδή περιοχή μπροστά από τα υπάρχοντα φυσικά δόντια



# Ταξινόμηση κατά Kennedy

◆ IV. Πρόσθια νωθή περιοχή μπροστά από τα υπάρχοντα φυσικά δόντια



# Ταξινόμηση κατά Bailyn

- **Οδοντικής στήριξης**
- **Μικτής στήριξης**
- **Βλεννογόνιας στήριξης**

Κατά τον McCracken σαν Μ.Ο. πρέπει να  
θεωρούνται μόνο οι Μ.Ο. ελευθέρου-  
ελευθέρων άκρων.

*Οι κατηγορίες κατά Kennedy και οι κατηγορίες κατά Bailyn δίνουν κατεύθυνση για τη σχεδίαση της ΜΟ, βασικός παράγοντας επιτυχίας και μακροβιότητας της πρόσθεσης*

*Καθοδηγούν ουσιαστικά τον Οδοντικό Τεχνολόγο για τον τρόπο λειτουργίας της ΜΟ και ποιες παραμέτρους πρέπει να λάβει υπ' όψη του κατά τη σχεδίασής της*

*Οι δύο αυτές κατηγοριοποιήσεις χρησιμοποιούνται διεθνώς για τον χαρακτηρισμό των ΜΟ και ως «κώδικας» επικοινωνίας μεταξύ των κλινικών και εργαστηριακών*