




ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΝΝ

Τρίκα Παναγιώτα

Μαία ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ

Rn, MSc, PhD (c) Μαιευτικής ΠΑΔΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ



ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

	ΓΕΝΟΣΗΜΑ	
TOBREX	EYETOBRIN	
IG VENA	γ- ΣΦΑΙΡΙΝΗ	NANOGAM
INVANZ	ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ ΦΑΡΜΑΚΟ	
SOLU CORTEF	LYO CORTIN	
SOLU MEDROL	LYO DROL	
ROCHEPHIN	MEDAXONE	
ROCHEPHIN	VERACOLE	
MERONEM	MERENEX	MEROZAN
HUMAN ALBUMIN	PLASBUMIN HUMAN	
REVATIO	VIAGRA	
TAZOCIN	TAVOCTAME	
CIPROXIN	UFEXIL	
MAXIPIME	VERAPIME	
ZINACEF	ZILISTEN	
ZYVOXID	ZETALID	
XYLOCAINE	XYLOZAN	
GENTAMYCIN	OCTORET	
GRANULOCINE	NIVESTIM	
VONCON	VONDEM	
ATROVEN	ZYROLLEN	
VIAGRA	REVATIO	
LORDIN	ESELAN	
SOLVETAN	LEMOXOL	KECTASIDIN
DEXACHLOR	RADEX	
FLAGYL	COLPOCIN/METRONIDAZOLE	
CUBICIN	DAPTOMYCIN	cuprio
TAVANIC	TALERIN	
DECADRON	DEXATON	
NIMBEX	CICATRAL	
Levocarnitin -> Supravain		
Augmentin / Amoxicillin / Taromentin		
Cefepime / Staphylococcus		

σιασοβιδον =
Proglycem
(πασιναρε)

Cefazolin

Vifazolin

Capoten = Normodur

StaphyClox =
Flucloxacillin

Targocid
Talinac

Naloxon/
Narcan
Avrisoto
Fentanyl

INOTREX =
Dobutan
(dobutamine)

Keppra:
Levetiracetam
~~Keppra~~
targoad -> Talinac

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

- AMPICILLIN: 1g. Διαλύεται με 5ml WFI
- APOTEL: 1g / 6.7ml
- BRIKLIN: 250mg. Διαλύεται με 0,5ml φ.ο..
- GETAMICIN: Για Gram- αρνητικά και Gram- θετικά μικρόβια
40 mg = 2ml
- LASIX: 20mg = 1ml
- MERONEM: Βρογχικές λοιμώξεις, λοιμώξεις του ουροποιητικού, του δέρματος, μαλακών μορίων, μηνιγγίτιδα. Διαλύεται με φ.ο. 20ml. Στάγδην σε 30 λεπτά
500mg = 20 ml
25mg = 1ml
Παράδειγμα: 25mg 1ml
20mg x;
- VIFAZOLINE: 1g. Διαλύεται με 10ml φ.ο..


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

ΚΑΡΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ			
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ:			
ΑΡ. ΔΩΜΑΤΙΟΥ:			
ΦΑΡΜΑΚΑ (Δόση-Συχνότητα-Οδός)	ΙΑΤΡΟΣ - ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ
19/3/25 MD ροή	2, 6cc/R		
19/3/25 Amoxicillin	30 mgr x 2 iv		12 ²⁰
19/3/25 Γενταμικίνη	3 mgr ανά 48 h iv		12 ²⁰
19/3/25 Κονακίνη	0,5 mgr im επάνω		12 ¹⁰
19/3/25 Morfina	12 mgr iv επάνω		12 ²⁰
19/3/25 Curosurf	1,5cc ETT επάνω		

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

ΑΡ. ΔΩΜΑΤΙΟΥ:			
ΦΑΡΜΑΚΑ (Δόση-Συχνότητα-Οδός)	ΙΑΤΡΟΣ - ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ
1/8 φιά 0.1% 20cc/4			09/11
Konakio 2mg	1.11 Εφ'ανδρ		10/11
X 1/4 φιά 5b. 3ml			14/11
Ampicillin 149 mg x 2	1.11		14/11
Gentamycin 12mg x 1 iv	enitn. neiv 3ηδία		
Curasulf 7.5ml ET			
22/12/25 1ml morphine + 9ml 0.1% → and auto → 0.7ml + 1.7ml 0.1% → pon 0.1 ml/h (=10x1kg/h)		(iv)	
		ΠΑΚΕΤΕΣ Α. ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΜΒΕΒΑΗΜΕΝΕΣ	

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

	ΦΑΡΜΑΚΑ (Δόση-Συχνότητα-Οδός)	ΙΑΤΡΟΣ - ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΗΜ
		ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ		
12/2	Meropenem 40 mg x 3 / 24 h	iv		
12/2	Gentamycin iv. 8,0 mg x 1	(C) 6 mg 3 ^h 00' 00"		
12/2	Apotel 30 mg x 4	iv.		
	Caffeine 10 mg x 1	iv		
10/2	Δ-πε Dofamine 4,4 α + + b/w 5% 3,4 α => por 0,2 α/h = (5 μg/kg/min)			
12/2	gentamycin 6,5 mg x 1	iv εντν εδω 33' 00"		

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ)

 ΜΗΤΕΡΑ
ΜΕΛΟΣ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΗΔ

ΑΔΕΝΟΣΙΝΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

$50 \times 1 \text{ kg} = 0,13 \text{ mgr} = 0,5 \text{ cc διαγίρατος}$

$1 \text{ ml διαγίρατος αδενόσινης} = 3 \text{ mgr}$

$1 \text{ ml} + 9 \text{ ml } \phi_0 = 3 \text{ mgr}$

$10 \text{ ml διαγίρατος} = 3 \text{ mgr}$

$\boxed{1 \text{ ml διαγίρατος}} = 0,3 \text{ mgr}$
αδενόσινης

) $0,13 \text{ mgr}$

$\boxed{1 \text{ cc } \phi_0 \text{ } 0,13 \text{ mgr}}$

$= \boxed{0,5 \text{ ml}}$ διαγίρατος
push in

$\left[\boxed{2 \text{ cc}} + \boxed{0,5 \text{ ml}} + \boxed{3 \text{ cc } \phi_0} \right]$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ)

ΦΑΡΜΑΚΑ (Δοσπ-Συχνότητα-Οδός)	ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ
+ $D_{pos} DW 10-1. 208 ml$ $Ca glu 5-1. 17,7 ml$ $DW 10-1.$ $6 ml$	$1. v push$		
1313125 Διεύθυνση ασθενοτήτων 1ml + 9ml + 0.9 $\Rightarrow 1ml \text{ Signatura} = 0,3 \text{ mgr/kg}$			
$a = 1 = 17$ (1) 50 mgr ασθενοτήτων 50 mgr/kg (0,5 cc 81)			
$a = 1 = 25$ (2) 50 mgr ασθενοτήτων 50 mgr/kg (0,5 cc 81)			
$a = 1 = 33$ (3) 100 mgr ασθενοτήτων 100 mgr/kg (= 2)			
Inderal $3 \text{ mg} \times 3$ (PRN)			
Atrocein 0,05 mg IV push			
1313 Fentanyl $2,5 \times \text{αέρα GL}$ $(0,05-2)$	3 ενδο IV		
1313 $Morphine$ $0,3 \text{ ml} + 2,7 \text{ ml NIS}$ $\text{Αναμειγνύεται σε 300 ml}$ $\text{ναίεσθαι } 0,3 \text{ ml (300)}$ $+ 11,7 \text{ ml NIS } 0,9\%$	PRN $0,5 \text{ ml}$ (5 mgr/kg)		
1313 Curasol $0,5 \text{ ml}$ (5 mgr) Ελαφρύ CT			
1413 Dormicum $0,3 \text{ mgr PRN}$			
1413 $X \text{ λωρην}$ 3 PRN			

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5 (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ)

ΚΑΡΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ:

ΑΡ. ΔΩΜΑΤΙΟΥ:

ΦΑΡΜΑΚΑ (Δόση-Συχνότητα-Οδός)	ΙΑΤΡΟΣ - ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΑ
Rocuronium 1,2mg push	IV ανά		
Rocuronium (50mg/5ml) iv 21mg (2,1ml) + 2,7ml NS	ανά 0,2ml/kg (7,8mg/min)		
Human Albumin 25% 6ml (1.5gr)	6cc 4 wets.		
Eyesobrin 26t x3 AD			
14/3/25 HA 25%	10 ml iv	αφ' ου	
34/3/25 3cc 25 cc	6cc 2h + 2mgv 2acc		
Dormicum 0,4mg υποδ. PRN			
Morphium 0,5mg (+ IN) 50,9% 4,8ml	(0,05ml) = 0,05ml/kg	0,2ml/kg	
HA 25% 10ml ή στο τέρμα 2mg λαπα (iv)			
χλωραλν 5% 2ml			

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6 (ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ:			
ΑΡ. ΔΩΜΑΤΙΟΥ:			
ΦΑΡΜΑΚΑ (Δόση-Συχνότητα-Οδός)	ΙΑΤΡΟΣ - ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ
8/3 ✓ Konakion im 1mg εφ' αναΐ	Π. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΝΕΤ. ΓΕΝ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΥΜΕΤΕΡΑΝΤΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤ. ΙΑΤΡΟΣ ΠΑ.Δ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ	12
D1W 10% 250ml 6.5 ml/h			
χλωραλν 5% 2ml εφ' αναΐ			13 ¹⁰ 18 ⁵⁰
Curasurf 5ml εφ' αναΐ ΕΤ		ΜΠΛΟΥΒΑΡΗ ΠΑΝΙΤΡΟΖ ΑΜΙΝΟ	14 ⁴⁵ 20 ⁵⁰
NaCl 0.9% 20ml 6 + 1 1/2 ώρα iv			24 ⁰⁰
✓ Ινσουλίνη 1ml + 9ml φ.0. ανι αυτο 1ml + 9ml φ.0. ανι αυτο 0.5ml + 2ml φ.0. ενι 0.1ml/h = 9			
D1W 10% 250ml (+1 22ml CaGl 5% 918ml)		πον'	
17.3.25			

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6 (ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ)

ACTRAPID / INSULIN
100 units/1ml ινσουλίνης

ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ #####

Στο κύκλωμα (λίπους) χορηγούμε 8ml ινσουλίνης αναραιωτή και ξεπλένουμε με water. Φτιάχνουμε το διάλυμα ινσουλίνης σύμφωνα με τις οδηγίες και κάνουμε εξαέρωση στο κύκλωμα.

Σε συνεχή έγχυση Insulin IV αραιώνεται με DW5% και NaCl 0.9%

100 units σε 1ml ινσουλίνης άρα
100 units σε 100 γραμμές mantou άρα
1 units σε 1 γραμμή mantou

Υπολογίζουμε την ζητούμενη ποσότητα με τη μέθοδο των τριών και προσθέτουμε DW5% ή NaCl 0.9%

Για υποδόρια χορήγηση Actrapid 100IU 10ML Αραίωση ινσουλίνης:
Παίρνουμε 10 γραμμές ινσουλίνης και 90 γραμμές νερό. Από την αραίωση παίρνουμε 10 γραμμές διαλύματος και 90 γραμμές νερό.
Κάνουμε μέθοδο των τριών και χορηγούμε την ινσουλίνη υποδόρια.

Οι 0.05 IU είναι 5 γραμμές
Π.χ. θέλουμε 0,15 IU

$$\begin{array}{rcl} 0,05 \text{ IU} & 5 \text{ γραμμές} & 0,05 \text{ ml} \\ 0,15 \text{ IU} & \text{X?} & = 15 \text{ γραμμές} \end{array}$$
$$\frac{0,15 \times 5}{0,05} = 15 \text{ γραμμές}$$

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6 (ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ)



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7 (ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: ΜΟΝΟ			
ΑΡ. ΔΩΜΑΤΙΟΥ:			
	ΦΑΡΜΑΚΑ (Δόση-Συχνότητα-Οδός)	ΙΑΤΡΟΣ - ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ
13/2	8-σφαίριμ 16 ml σε 3 hrs	IV x 1.	12/2
13/2	PLT- 30 cc - IV σε 1 ώρα		12/2
14/2	Lasix 2mg μπανά.		12/2
	PLT 30 cc σε 1 ώρα IV.		
	Lasix 2mg στο τέλος της μεταγγίσεως IV.		
14/2	Gentamicin 6.5 mg x 1	1.4 5mg κενό δοσ	
14/2	PLT 30 ml σε 1h		
15/2	PLT 30 ml σε 1h		
15/2	PLT- IV.		
16/2	30 ml σε 1 ώρα		
17/2	Αιμοπετάλια IV 30 ml σε 1 ώρα		

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

